inO SOUFRE - Mg

NUTRITION MAGNESIUM

ENGRAIS CE - Solution de sulfate de magnésium

COMPOSITION

MgO	85 g/L
SO_3	167 g/L

Produit de la gamme iNO-Nutrition, utilisable en agriculture biologique en application du RCE n°834/2007

CARACTÉRISTIQUES

Formulation	A base de sulfate de magnésium
Utilisation	Foliaire
Conditionnement	10 L (palette 600L)
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel
Conservation du produit	18 mois
Effet acidifiant sur la bouillie	aucun
Forme	Liquide - (SL)
Densité	1,22

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

Rôles des éléments

Soufre :
- Constituant des protéines
- Rôle enzymatique
- Photosynthèse

Magnésium :
- Photosynthèse
- Synthèse des glucides et lipides

Caractéristiques

inO SOUFRE-MG prévient et corrige les déficiences en magnésium de toutes les cultures par application foliaire.

inO SOUFRE-MG garantit des hauts niveaux de rendement et améliore la qualité des productions. Il apporte les éléments nutritionnels Soufre et Magnésium sous des formes liquides fortement concentrées 100% solubles et d'une grande pureté pour être 100% efficaces.

inO SOUFRE-MG est un produit liquide prêt à l'emploi et polyvalent.

Intérêts de la formulation

Ce produit est formulé à base de matières premières rigoureusement sélectionnées, garanties par notre contrôle qualité, pour assurer une parfaite sécurité d'emploi et une répartition homogène du produit sur le feuillage.

MODE D'EMPLOI

Principales cultures	Doses /ha	Concentration maximale d'utilisation	Périodes d'application
Vigne	5 L 8 L	4 %	> Nutrition Magnésienne - Stades : Grappes séparées - Début floraison - Nouaison - Fermeture de la grappe > Lutte contre le dessèchement de la rafle - Stades : Fermeture de la grappe puis 2/3 semaines plus tard - Début véraison - Fin véraison
Arbres fruitiers	5-8 L		Chute des pétales (G) - Fruits noués (H) - Jeunes fruits (I)
Cultures légumières **Grandes cultures**	5-8 L		2 à 3 applications espacées de 10 jours sur feuillage suffisamment développé.

* Pour les cultures sous abri, procéder à un test préalable à la concentration de 2 % pour observer le comportement de la végétation.

CONSEILS PRATIQUES

Préparation de la bouillie

Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau / ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur l'ensemble du feuillage sans ruissellement. Préférer les traitements aux températures comprises entre 6 et 25 °C.
- Agiter le bidon pour homogénéisation.
- Verser progressivement le produit, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche.
- Rincer l'emballage deux fois.

En cas de mélange avec d'autres produits, effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit en dernier.